

SUPREP BOWEL PREP

ЗА ДЕНЬ ДО ПРОЦЕДУРЫ:

Легкий завтрак до 9:00 утра. Это может быть яйцо, хлеб, черный кофе-можно с сахаром, яблочный или светлый виноградный сок.

После завтрака в течение дня можно пить только прозрачную жидкость.

Нужно пить много воды, чтобы не было схваток в желудке.

Можно есть мясной, куриный, овощной бульон. Пить яблочный или светлый виноградный сок без мякоти.

Нельзя:

Молочные продукты, апельсиновый и томатный соки.

За 5 дней до процедуры необходимо прекратить прием аспирина и аспириносодержащих лекарств, плавикса и кумадина. За неделю до процедуры не принимать железосодержащие препараты.

Прием SUPREP:

В _____ выполните все шаги с 1-го по 4-ый с первой бутылкой.

1. Налейте жидкость (6 унций) из первой бутылки SUPREP в мерный стакан.
2. Долейте питьевую воду до мерной линии (16 унций) на стакане и перемешайте.
3. Выпейте всю жидкость из мерного стакана.
4. В течение 1 часа выпейте еще два (по 16 унций) мерных стакана воды.

Продолжайте пить прозрачную жидкость до ухода ко сну.

В _____ Полностью повторите все шаги с 1-го по 4-ый со второй бутылкой.

НИЧЕГО НЕ БРАТЬ В РОТ ПОСЛЕ ПОЛНОЧИ, ВКЛЮЧАЯ ВОДУ ПРИ УТРЕННЕЙ ПРОЦЕДУРЕ ИЛИ ЗА 4 ЧАСА ДО ДНЕВНОЙ ПРОЦЕДУРЫ. ВЫ НЕ ДОЛЖНЫ ВЕСТИ МАШИНУ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ. КТО-ТО ДОЛЖЕН ОТВЕЗТИ ВАС ДОМОЙ.

ВЫ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНИТЬ ВСЕ УКАЗАНИЯ